

## Feinstaub Langzeitexposition: Mortalität aufgrund kardiopulmonaler\* Erkrankungen (Erwachsene > 30 Jahre)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Attributable Todesfälle</b>	42.600	38.000	38.600	38.500	38.800	34.400	35.700	33.300	34.300
<b>Attributable Fraktion in Prozent</b>	13,8	12,4	12,5	12,7	13,1	11,5	11,5	11,5	11,0
<b>DALYs**</b>	393.000	348.200	350.200	347.900	345.700	302.700	315.000	293.600	298.900
<b>DALYs/1.000 Personen</b>	7,0	6,2	6,2	6,1	6,1	5,3	5,6	5,2	5,2

\*kardiopulmonal: das Herz und die Lunge betreffend

Quelle: Umweltbundesamt 2017, eigene Zusammenstellung

\*\*Disability-Adjusted Life Years

Die berechneten Raten beziehen sich immer auf die jeweilige Bezugsbevölkerung (hier Erwachsene > 30 Jahre)

### Erläuterungen zu den Begriffen:

Anzahl vorzeitiger Todesfälle: Anzahl der vor Erreichen der statistisch durchschnittlichen Lebenserwartung eingetretenen Todesfälle;

Attributable Fraktion: sie gibt an, wie viel Prozent der gewählten erkrankungsbedingten Sterbefälle durch die Feinstaubexposition bedingt sind;

Attributable DALYs: sie geben an, wie viel Zeit (in Jahren) zwischen den eingetretenen Todesfällen bis zur durchschnittlich erwarteten Lebenserwartung bei Versterben durch die Wirkung der Umweltstressoren verloren gegangen ist (als Summe für die Gesamtbevölkerung);

Attributable DALYs, bezogen auf je 1.000 Personen: es werden die zuvor aufgeführten DALYs zur besseren Vergleichbarkeit der Krankheitslasten als Rate pro 1.000 Personen angegeben.