

Jahresmittel Schwefeldioxid [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Kontinuierliches Messverfahren, Werte bezogen auf 1013 hPa und 20 °C

	Westerland	Zingst	Neuglobsow	Waldhof	Schmücke	Deuselbach	Brotjacklriegel	Schauinsland	Forellengbach	Helgoland	Aukrug	Uecker- münde	Schorf- heide	Bassum	Gittrup	Falkenberg	Melpitz	Leine- felde	Lückendorf	Lehnmühle	Regnitz- losau	Öhringen	Raisting	
1984	8.2			22.3		16.0		4.1						12.1	15.1								29.2	
1985	8.1			25.0		16.1		5.2						12.6	12.8								33.9	
1986	5.7			21.7		14.1	9.4	5.6						11.1	10.9								29.2	
1987	5.7					14.5	10.1	6.0						12.5	12.7								34.8	
1988	4.5			20.1		8.7	5.9	2.8						7.3	10.3			19.5	40.1				25.3	
1989	4.5			20.4		9.4	5.7	3.3							11.3		34.7	22.6	36.7				28.0	
1990	4.0			14.4		6.3	6.2	4.0						7.5			21.4	11.8	23.8	29.5	22.0			
1991	6.3			17.7		7.4	3.9	4.0									17.0	9.2	26.5	30.3				
1992	3.9	5.3	8.4	9.7	14.3	5.3	3.3	2.9				13.0					16.9	12.1	32.9	35.2				
1993	6.1	4.7	9.8	11.0	14.2	5.2	3.2	2.8				11.2						6.2	24.8	17.7				
1994	4.3	4.8	6.8	7.1	10.6	4.4	2.8	2.2		6.9		8.8					5.4	4.4	14.4	10.5				
1995	2.9	5.5	7.0	6.4	9.9	5.0		3.4				8.5				5.1	4.9	4.1	9.0	6.7	5.3			
1996	4.0	6.7	9.6	9.6	15.6	7.6				4.9		10.4	4.3	2.0	3.9	4.3	4.0	2.9	5.9	6.3	3.7			
1997	3.1	3.7	4.3	6.5	6.7	7.0		2.3		5.1		7.0	3.1		3.7	4.0	3.4	3.1	5.6	5.0	4.4			
1998	2.6	3.5	3.4	4.8	3.8	4.2	3.9	2.7		3.7		5.8	3.3		3.4	4.1	3.5	3.9	6.7	6.0	4.4		2.1	
1999	3.8	3.5	3.7	4.1	3.6	3.7	3.3	2.0			3.3	3.9	3.3	3.2	3.5	3.7	3.6	4.5	7.3	6.1	4.1	3.3	1.7	
2000	2.2	3.3	4.4	3.2	2.6	3.9	3.9	2.2	1.9			3.8	2.9	2.3	3.4	3.0	3.0	2.6	4.7	4.1	3.4	2.0	2.1	
2001	1.5	2.2	2.5	2.2	1.4	2.7		1.1	1.9			3.8	2.5				2.9		5.3					
2002	1.7	2.1	1.9	1.6	1.5	2.7	2.0	1.1	1.7	2.5		3.2												
2003	1.9	2.9	1.7	1.9	2.2	3.3	2.5	1.3	2.1	2.8	2.1	2.7												
2004	1.16	2.25	1.49	1.54	1.10	Messungen eingestellt		1.08	1.01		1.9	2.9												
2005	1.06	1.78	1.19	1.31	1.42			1.34	1.36		2.1	2.5												
2006	0.99	2.22	1.60	1.66	1.39			1.11	0.99	Messungen eingestellt														
2007	1.08	2.07	1.00	1.41	1.23			0.89	0.70															
2008	1.03	1.84	1.82	1.26	1.10			0.65	0.52															
2009	1.15	1.04	1.82	1.40	1.53			0.70	0.56															
2010	0.80	1.70	1.86	1.75	1.49			0.80	0.76															

	Westerland	Zingst	Neuglobsow	Waldhof	Schmücke	Deuselbach	Brotjackriegel	Schauinsland	Forellengbach	Helgoland	Aukrug	Uecker- münde	Schorf- heide	Bassum	Gittrup	Falkenberg	Melpitz	Leine- felde	Lückendorf	Lehnmühle	Regnitz- losau	Öhringen	Raisting
2011	0.92	1.36	1.43	1.27	1.29			0.49	1.08														
2012	0.66	1.14	1.39	1.06	1.27			0.61	1.11														
2013	0.73	1.13	1.09	1.02	1.10			0.52	1.65														
2014	0.34	1.63	1.33	1.06	0.96			0.56	1.31														
2015	0.28	0.60	0.80	0.67	0.78			0.46	1.15														
2016	0.32	0.58	0.92	0.72	0.68			0.49	1.28														
2017	0.35	0.79	0.74	0.77	0.56			0.60	0.76														
2018	0.32	0.90	0.96	0.77	0.98			0.50	0.89														
2019	0.23	0.70	0.77	0.66	0.74			0.26	0.84														
2020	0.40	0.71	0.90	0.70	0.66			0.32	1.13														

Quelle: Daten des Luftmessnetzes des Umweltbundesamtes