

PCB und Dioxine in Rindfleisch nach verschiedenen Haltungsformen in Deutschland

WHO-PCB-TEQ (obere Grenze, TEF 1998) in pg/g Fett (Herkunft Deutschland, 2000 bis 2012)

Haltung	Anzahl	Mittelwert	Median	Perzentil 90	Maximum	AW	n > AW
Stallhaltung	32	0,52	0,26	1,52	2,58	1	5
Weide-, Freilandhaltung	251	2,5	2,01	3,91	49,53	1	212
Erzeugnis nach Öko-VO	66	2,13	1,82	3,72	5,47	1	57
Unbekannt	404	1,82	1,27	3,32	25,1	1	239

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (obere Grenze, TEF 1998) in pg/g Fett (Herkunft Deutschland, 2000 bis 2012)

Haltung	Anzahl	Mittelwert	Median	Perzentil 90	Maximum	HG	n > HG
Stallhaltung	32	0,87	0,56	2,06	3,54	4,5	
Weide-, Freilandhaltung	251	3,24	2,74	5,06	50,8	4,5	42
Erzeugnis nach Öko-VO	66	2,67	2,46	4,50	6,61	4,5	6
Unbekannt	402	2,61	1,86	4,76	29,9	4,5	43

Summe ndl-PCB (obere Grenze) in ng/g Fett (Herkunft Deutschland, 2000 bis 2012)

Haltung	Anzahl	Mittelwert	Median	Perzentil 90	Maximum	HG	n > HG
Stallhaltung	34	2,65	1,70	5,65	17	40	
Weide-, Freilandhaltung	113	13,45	11,4	22,63	70,37	40	3
Erzeugnis nach Öko-VO	64	14,55	13,12	26,12	43,87	40	1
Unbekannt	338	15,96	10,68	36,01	136,2	40	28

HG: Höchstgehalt gemäß VO (EG) Nr. 1881/2006

AW: Auslösewert gemäß Empfehlung 2006/88/EG

Quelle: Auswertung der POP-Dioxindatenbank des Bundes und der Länder durch das BVL (Erstes Fachgespräch am 5.2.2013)